

Tabella 1. Elenco delle varietà consigliate e loro caratteristiche.

Varietà	Ciclo vegetativo (*)	Predisposizione alla raccolta meccanica	Attitudine nei riguardi delle principali fitopatie (**)		
			Resistenza	Tolleranza	Sensibilità
Virginia Bright					
NC 55	T	SI	PVY		TMV, CMV Marciume radicale
AGR 92	M	SI			TMV, CMV Peronospora
K 326	T	SI			TMV, CMV, PVY Marciume radicale
K 394	M	SI		Marciume radicale	TMV, CMV, PVY Nematodi
MN 944	MT	SI		Marciume radicale	TMV, CMV PVY
GL 26 H	MT	SI	TMV		PVY
ITB 609	P	NO	PVY	Marciume radicale	Peronospora
PVH 19	P	SI	TMV-PVY	TMV	Marciume radicale
NC 100	T	SI	TMV-PVY		Marciume radicale
NC 102	MT	SI	TMV	Marciume radicale	
NC 109					
AS 44	MT	SI		Marciume radicale	TMV PVY
AS 44 DF	M	SI		Marciume radicale	TMV PVY
AS 04	M	SI		Marciume radicale	TMV, PVY Nematodi
AS 06	T	SI			TMV, PVY Marciume radicale
Burley					
VIVA	T	-	Peronospora	Virosi	
C 104	P	SI			CMV
FB 8	M	-			Peronospora
FB 9	T	-		TMV, PVY	
F 3117	M	-		PVY	
F 3119	P	SI		TMV	
Kentucky					
171	P				PVY
171 x 104	M				PVY
171 x madole	T				PVY
Foiano	M,P		PVY		
Nostr. Benev.	M			PVY	

(*) T: tardivo; M: medio; P: precoce

(**) TMV (Tobacco mosaic virus), CMV (Cucumber mosaic virus), PVY (Potato virus Y), Marciume radicale (*Chalara elegans*), Peronospora (*Peronospora tabacina*), Nematodi (*Meloidogyne* spp.)

06A02896