

2.5 La salute della popolazione

La lettura dei principali indicatori e delle indagini epidemiologiche confermano che la salute della popolazione non desta particolari preoccupazioni.

N.B. I dati relativi agli indicatori sono desunti dalle relazioni sanitarie dei distretti A, B e C dell'anno 2000 (ultimi dati disponibili).

Ulteriori parziali aggiornamenti riferiti al 2002 confermano la sostanziale stabilità dei dati.

Gli approfondimenti riguardanti le dipendenze e la disabilità sono elaborazioni curate dell'Ambito e aggiornate al 2002.

Vaccinazioni e malattie infettive

Indicatori ex art. 10	2000	
	N° res. Compimento 2° anno di età che hanno completato le vaccinazioni obbligatorie esclusa la 4° polio) / n° res. che hanno compiuto 2 anni nel corso dell'anno	818/820
N° res. che al compimento del 3° anno di età sono stati vaccinati contro il morbillo / n° res. che hanno compiuto 3 anni nel corso dell'anno	767/830	92,4%
N° soggetti > 65 anni vaccinati contro l'influenza / totale soggetti >65 anni	13447/23140	58,1%
N° nuovi casi di Tbc / popolazione residente	5/103093	0,48%
N° focolai di tossinfezioni alimentari (almeno due casi riconducibili ad una sola causa) / residenti	0/103093	0,0%

Assistenza domiciliare

Indicatori ex art. 10	2000	
	n° MMG che fanno ADI/tot MMG	78/85

n° assistiti ADP/pop residente >65aa	1674/23140	7,2%
n° assistiti ADI I° livello/pop. Res.>65aa	403/23140	1,74%
n° assistiti ADI II° livello/pop. Res.>65aa	352/23140	1,52%
n° assistiti ADI III° livello/pop. Res.>65aa	7/23140	0.03%
n° ospiti res. Case di Riposo/pop. Res.>65aa	693/23140	2,99 %
n° ospiti res. Case di Riposo in ADI/n° ospiti	295/693	42,5%

Assistenza residenziale e semi - residenziale

Indicatori ex art. 10	2000	
N° ospiti res. Case di Riposo in ADI /h° ospiti	295/693	42.5%
N° ospiti res.Case di Riposo / pop. res. > 65 aa	693/23140	2,99%
N° residenti in RSA/pop. residente>65 aa	414/23140	1,78%
N° ospiti in RSA allettati e affetti da piaghe/totale ospiti	58/173	33,5%
N° degenze in RSA > di tre mesi/totale degenze in RSA	52/414	14,6%

Assistenza sanitaria di base

Indicatori ex art. 10	2000	
N° assistibili 0-6 aa. che hanno scelto il PLS/ pop. res. 0-6 aa.	4838/5687	85%
N° ore apertura sett. Ambulatorio MMG/n° assistiti MMG	1870/99679	0,01%

N° ore apertura sett. Ambulatorio PLS/n° assistiti PLS	143/9243	0,01%
N° scelte PLS / pop. Residente in età infantile	9762/ 12747	76,5%
N° MMG in gruppi o associazioni/totale MMG	53/85	62%
N° MMG %° / pop. Residente > 14 aa.	85794346	0,90%°
N° PLS %° / pop. Residente <14 aa.	11/11844	0,92%°
N° visite effettuate dalla Guardia Medica %° / pop. residente	28442/103093	275%°

Attività del Consultorio Minori

Consultorio Minori	2000
N° casi Tribunale dei Minori	63
N° casi Procura della Repubblica	31
Altri casi	54
Minori riconosciuti dalla sola madre	10
Affidi familiari e Comunità	13
TOTALI	171

Accessi al Pronto Soccorso

Pronto Soccorso ASL n. 5	2001
---------------------------------	-------------

N° casi totali	25280
----------------	-------

N° Incidenti Stradali	2411
N° per fascia d'età 16 – 26 anni	F. 266 – M. 362
N° per fascia d'età 27 – 35 anni	F. 231 – M. 285
N° Infortuni sul lavoro	3384

Tasso di mortalità per categorie/ 100.000 anno 2000

Malattie cardiovascolari	554
Tumori	331
Malattie apparato circolatorio	59
Traumatismi e avvelenamenti	30
Malattie apparato digerente	23
Malattie endocrine e metaboliche	9
Malattie sistema nervoso	59
Malattie apparato genito - urinario	10

APPROFONDIMENTI:

Andamento del fenomeno delle Tossicodipendenze dal 1991 al 2001

Nel decennio compreso tra il 1991 ed il 2001, è possibile osservare alcune caratteristiche del fenomeno della tossicodipendenza ed il loro cambiamento, in questo arco di tempo:

- Fasce d'età

Per quello che riguarda l'età degli utenti, la fascia più cospicua è passata da quella tra i 25 ed i 29 anni, a quella tra i 20 ed i 24 anni, sintomo di un abbassamento dell'età dei consumatori che sono sempre più giovani.

Relativamente al sesso, i maschi continuano ad essere prevalenti rispetto alle femmine, sia tra i pazienti già presi in carico che tra i nuovi utenti.

- Sostanza d'abuso

La sostanza d'abuso primario è sempre l'eroina (anche se si assiste ad una sostanziale riduzione), ma negli ultimi anni sono emersi numeri significativi, anche per quello che riguarda sostanze stimolanti come l'ecstasy, la cocaina e le anfetamine.

I cannabinoidi continuano ad essere le sostanze prevalenti di abuso secondario, ma sono immediatamente seguiti dall'alcool, dalla cocaina e dall'ecstasy.

Per tutte le tossicodipendenze da eroina, la sostanza iniziale è stata la cannabis.

- Inizio dell'assunzione

L'età media per le prime assunzioni di droghe leggere è intorno ai 15 anni, mentre in media, le prime assunzioni di eroina, si hanno intorno ai 19 anni: è possibile, comunque, affermare che c'è una tendenza alla diminuzione dell'età di inizio dell'uso di eroina.

Nel tempo, è anche diminuito il periodo che intercorre tra le prime assunzioni di droga e la richiesta d'aiuto, attraverso il contatto con il Servizio. I motivi di tale andamento possono essere: la maggiore sensibilizzazione al fenomeno, la maggiore consapevolezza del problema, ma anche la presenza sempre più forte del servizio sul territorio.

- Scolarità

La maggioranza degli utenti continua ad essere rappresentata da soggetti che hanno conseguito solo la licenza media inferiore; in pochi hanno il diploma di scuola media superiore o la laurea.

Sembra confermato, quindi, che la tossicodipendenza colpisce prevalentemente le fasce culturalmente svantaggiate. Anche la dispersione scolastica è un indicatore rilevante sia per quello che riguarda il coinvolgimento in tale fenomeno, sia per i tempi di recupero.

- Occupazione

Relativamente alla condizione professionale, sono occupati stabilmente circa metà degli utenti, i restanti sono disoccupati o sottoccupati; in aumento gli studenti.

- Inserimenti in Comunità

Il numero di soggetti inseriti in Comunità Terapeutiche risulta piuttosto costante, così come le frequenti interruzioni volontarie.

Circa 1/4, termina positivamente il percorso terapeutico residenziale.

- Sieropositività

I soggetti che risultano HIV positivi sono in diminuzione; la maggior parte dei contagi, infatti, sono avvenuti tra il 1980 ed il 1985. Rari i casi di contrazione del virus negli ultimi anni.

Diminuiscono i pazienti positivi all' HBV, mentre tendenzialmente costante rimane il numero dei soggetti positivi all' HCV.

- Nuove caratteristiche della tossicodipendenza oggi:

- Tossicodipendenti con disturbi psichiatrici, dove la tossicodipendenza copre gravi disturbi di personalità;

- Tossicodipendenti madri con figli in tenera età;
- Coppie tossicodipendenti anche con figli;
- Minori assuntori di sostanze stupefacenti;
- Tossicodipendenti soggetti a misure alternative al carcere;
- Giovani poli-assuntori di sostanze psicoattive;
- Multiproblematicità della dipendenza.

TOSSICODIPENDENZE 1991-2001

UTENTI PRESI IN CARICO

	1991	2001
Maschi	141	214
Femmine	29	40
TOTALE	170	254

FASCIA D'ETA' PREVALENTE

1991	25-29 anni
2001	20-24 anni

SOSTANZE D'ABUSO PREVALENTI

	1991	2001
Uso Primario	1- EROINA 2- CANNABINOIDI	1-EROINA 2-CANNABINOIDI 3-ECSTASY 4-COCAINA 5-ANFETAMINE
Uso secondario	1- BENZODIAZEPINE 2- CANNABINOIDI 3- ALCOOL 4- ALLUCINOGENI 5- COCAINA	1- CANNABINOIDI 2- ALCOOL 3- COCAINA 4- ECSTASY

TRATTAMENTI EFFETTUATI

1991	2001
- PSICO-SOCIALE	- Psicologico - Psico-Terapico - Servizio Sociale
- METADONE A BREVE TERMINE	- Metadone a breve termine - Metadone a medio termine
- METADONE A LUNGO TERMINE	- Metadone a lungo termine

**STRUTTURA PREVALENTE
PER I PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE**

1991	2001
- STRUTTURA PUBBLICA	- STRUTTURA PUBBLICA - STRUTTURA PRIVATA/CONVENZIONATA - STRUTTURA CARCERARIA

**N° INVII
IN STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI**

1991	19 utenti
2001	24 utenti

N° UTENTI RISULTATI POSITIVI AGLI ESAMI EFFETTUATI

	1991	1995	1998	2001

HIV	21	25	9	4
HBV	32	31	31	20
HCV	n.p.	60	60	70

ALCOOLDIPENDENZE anno 2001

UTENTI PRESI IN CARICO

FASCE D'ETA'	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
<19 ANNI	/	/	/
20 – 29 ANNI	5	/	5
30 – 39 ANNI	12	/	12
40 – 49 ANNI	14	2	16
50 – 59 ANNI	20	4	24

> 60 ANNI	7	1	8
TOTALE	58	7	65

BEVANDA ALCOLICA DI USO PREVALENTE

	MASCHI	FEMMINE
VINO	58	7

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTI EFFETTUATI/ N° PRESTAZIONI

MEDICO – FARMACOLOGICO	40
PSICO – TERAPEUTICO INDIVIDUALE	5
PSICO – TERAPEUTICO DI GRUPPO / FAMIGLIA	4
COUNSELLING	60
INSERIMENTI IN GRUPPI AUTO – MUTUO – AIUTO	1
SOCIO – RIABILITATIVI	5
INSERIMENTI IN COMUNITA' TERAPEUTICHE	2

DATI DI RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOOLCORRELATE

Anno	N° ricoverati	Maschi	Femmine
1999	25	18	7
2000	42	30	12
2001	43	39	4

FASCE D'ETA' PREVALENTE NEI RICOVERI PER PATOLOGIE ALCOOLCORRELATE:

41 – 55 ANNI

Fonte Ser.T.- Asl n.5, n.s elaborazione